

Information à l'intention des patients ou de leur famille

Lyon, le 18 mars 2009

Madame, Monsieur,

Suite à la rupture de stock d'Anapen 0.15mg/0.3ml solution injectable en seringue pré-remplie et en accord avec l'Agence Française du médicament (AFSSAPS), Mylan met à disposition de votre enfant le médicament EPIPEN Jr (Epinephrine) Auto-injector 0.15mg, initialement destiné à être commercialisé aux Etats-Unis et ceci dans l'attente du retour à un approvisionnement normal du produit ANAPEN 0.15mg.


L'Anapen 0.15mg et l'Epipen 0.15mg contiennent tous les deux la même quantité d'adrénaline (aussi appelée épinéphrine aux Etats-Unis). Seul le dispositif d'auto-injection est différent.

Epipen 0.15mg est autorisé en France depuis septembre 2008 mais n'est pas à ce jour commercialisé.

En France, Epipen 0.15mg est indiqué dans le traitement d'urgence des symptômes du choc anaphylactique provoqué par des cacahuètes ou par d'autres aliments, médicaments, morsure ou piqûre d'insectes, autres allergènes, ainsi que du choc anaphylactique idiopathique ou induit par un exercice physique.

La dose appropriée chez l'enfant de 15 kg à 30 kg est de 150 microgrammes d'adrénaline (ou épinéphrine). L'auto-injecteur Epipen 0.15mg/0.3ml est conçu pour délivrer une dose unique de 150 microgrammes d'adrénaline (ou épinéphrine).

Le dispositif d'administration d'Epipen étant différent de celui d'Anapen, et afin de vous aider à vous familiariser avec ce dispositif, une notice explicative en français est disponible dans l'étui. Nous vous conseillons de la lire intégralement. Nous vous rappelons ci dessous les modalités d'utilisation.



Après administration, une quantité de solution inutilisée reste dans la seringue. EPIPEN étant un dispositif unidose, il ne doit pas être réutilisé. Après utilisation, il faut replacer l'auto-injecteur dans son étui de protection et le jeter après emploi en respectant les précautions de sécurité nécessaires.

Vous devez contacter votre médecin ou vous rendre dans un service médical d'urgence dès que possible après l'injection.
Expliquez bien que vous avez pratiqué une injection intramusculaire d'adrénaline. Apportez la boîte et la notice au médecin que vous consulterez.

La distribution hospitalière cessera au retour à un approvisionnement normal de la spécialité Anapen 0.15mg.

Pour toute information, vous pouvez contacter notre service Information Médicale et Pharmacovigilance aux heures ouvrables au numéro azur 0811 22 4000 ou au 04 37 25 75 00 en dehors des heures ouvrables.

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Anne YVON
Pharmacien responsable