

CALCIPARINE SOUS CUTANEE 5000 UI/0,2 ml, solution injectable en seringue pré-remplie (SC) (héparine calcique) - Remise à disposition

04/12/2009

Cette héparine est une héparine classique, dite non fractionnée. Ses indications sont les suivantes :

Traitement :

- Des thromboses veineuses profondes constituées et de l'embolie pulmonaire, à la phase aiguë;
- De l'infarctus du myocarde avec ou sans onde Q et de l'angor instable, à la phase aiguë;
- Des embolies artérielles extracérébrales.

Indications

Prévention des accidents thromboemboliques veineux :

- En milieu chirurgical
- Chez les patients alités, présentant une affection médicale aiguë (notamment en post-infarctus, en cas d'insuffisance cardiaque, après un accident vasculaire cérébral ischémique avec paralysie des membres inférieurs).

L'utilisation est dans ce cas réservée à l'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine de l'ordre de moins de 30 ml/min selon l'estimation de la formule de Cockcroft) comme alternative possible à la prescription d'une héparine de bas poids moléculaire.

Laboratoire exploitant

SANOFI AVENTIS FRANCE

Origine du signalement

SANOFI AVENTIS FRANCE

Date de signalement à l'Afssaps

05/03/2009

Observations particulières

1 A l'hôpital

- Remise à disposition progressive du dosage 5000 UI/0,2 ml (boîte de 10) depuis le 27 novembre 2009

2 En ville :

- Remise à disposition progressive du dosage 5000 UI/0,2 ml (boîte de 2) depuis le 8 octobre 2009