

ALTIM 3,75 mg/1,5 ml (cortivazol), suspension injectable en seringue pré-remplie - Risque de rupture de stock

22/01/2010

Ce sont celles de la corticothérapie locale, lorsque l'affection justifie une forte concentration locale. Toute prescription d'injection locale doit faire la part du danger infectieux notamment du risque de favoriser une prolifération bactérienne. Ce produit est indiqué dans les affections rhumatologiques :

Indications

- en injection intra-articulaire: arthrites inflammatoires, arthrose en poussée
- en injection péri-articulaire: tendinites, bursites
- en injection des parties molles: talalgies, syndrome du canal carpien, maladie de Dupuytren
- en injection épidurale: radiculalgies

Laboratoire exploitant

SANOFI AVENTIS FRANCE

Origine du signalement

SANOFI AVENTIS FRANCE

Date de signalement à l'Afssaps

25/09/2009

- Risque de rupture de stock en officines et à l'hôpital
- Lettre d'information du laboratoire Sanofi-Aventis aux professionnels de santé ville et hôpital (05/10/2009)  (302 ko) : Rhumatologues, Radiologues, Médecins Généralistes et Orthopédistes
- Lettre d'information du laboratoire Sanofi-Aventis aux pharmaciens ville et hôpital et grossistes (05/10/2009)  (301 ko)

Observations particulières

- Point sur la rupture de stock de corticoïdes injectables en rhumatologie (15/01/2010)
- Lettres d'information du laboratoire Sanofi Aventis en date du 15/01/2010 en cours de diffusion aux professionnels de santé ville et hôpital :
 - Lettre adressée aux rhumatologues, radiologues, médecins généralistes, chirurgiens orthopédistes (15/01/2010)  (306 ko)
 - Lettre adressée aux pharmaciens (15/01/2010)  (307 ko)
- Remise à disposition contingentée à compter du 25 janvier 2010