

DIPROSTENE suspension injectable en seringue pré-remplie (dipropionate et phosphate disodique de bétaméthasone) - Rupture de stock en ville

17/11/2011

USAGE SYSTEMIQUE

- Rhinite allergique saisonnière après échec des autres thérapeutiques (antihistaminique par voie générale, corticoïde intra-nasal, ou corticoïde per os en cure courte).

USAGE LOCAL

Ce sont celles de la corticothérapie locale, lorsque l'affection justifie une forte concentration locale. Toute prescription d'injection locale doit faire la part du danger infectieux notamment du risque de favoriser une prolifération bactérienne.

Indications

Ce produit est indiqué dans les affections :

- dermatologiques: cicatrices chéloïdes
- ORL: irrigations intra-sinusiennes dans les sinusites subaiguës ou chroniques justifiant un drainage.
- rhumatologiques :
 - o injections intra-articulaires: arthrites inflammatoires, arthrose en poussée
 - o injections péri-articulaires: tendinites, bursites
 - o injections des parties molles: talalgies, syndrome du canal carpien, maladie de Dupuytren.

Laboratoire exploitant

MSD France (anciennement Schering-Plough)

Origine du signalement

MSD France (anciennement Schering-Plough)

Date de signalement à l'Afssaps

20/09/2010

Observations particulières

- Poursuite des difficultés de production
- En ville : stocks résiduels limités, rupture de stock imminente (estimée à mi-novembre 2011)
- Approvisionnement normal à l'hôpital
- Retour à un approvisionnement normal en ville inconnu