

OUTIL D'AIDE AU DIALOGUE AVEC VOTRE PATIENT

dans le cadre d'un traitement par Isotrétinoïne. **Adapté de l'Adolescent Depression Rating Scale (ADRS)¹**

Comment l'utiliser ?

- **Engagez un dialogue** avec votre patient sur son humeur au quotidien.
- Repérez certaines des affirmations ci-dessous pour **débuter** ou **orienter votre discussion**.
- **Evaluez l'état psychologique** de votre patient selon le contenu de vos dialogues.

- “Je n'ai pas d'énergie pour l'école, pour le travail”
- “J'ai du mal à réfléchir”
- “Je sens que la tristesse, le cafard me débordent en ce moment”
- “Il n'y a rien qui m'intéresse, plus rien qui m'amuse”
- “Ce que je fais ne sert à rien”
- “Au fond, quand c'est comme ça, j'ai envie de mourir”
- “Je ne supporte pas grand-chose”
- “Je me sens découragé”
- “Je dors très mal”
- “A l'école, au boulot, j'y arrive pas”

Des cas de dépression, dépression aggravée, d'anxiété, de tendance agressive, de changement d'humeur, de symptômes psychotiques, et de très rares cas d'idées suicidaires, de tentatives de suicide et de suicides ont été rapportés chez des patients traités par isotrétinoïne (voir rubrique 4.8 du Résumé des Caractéristiques du Produit).

Une attention particulière doit être portée aux patients présentant des antécédents de dépression et une surveillance des éventuels signes de dépression doit être effectuée chez tous les patients avec recours à un traitement approprié si nécessaire.

L'interruption de l'isotrétinoïne peut cependant être insuffisante pour maîtriser les symptômes et un bilan psychiatrique ou psychologique complémentaire peut alors être nécessaire.

Ce document est fourni à des fins de réduction des risques liés à l'utilisation de l'Isotrétinoïne.