

SYNTHÈSE D'AVIS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE

CORTISAL (salicylate de dipropylène glycol/prednisolone),
DEXTRARINE PHENYLBUTAZONE (sulfate de dextran/phénylbutazone), **PERCUTALGINE** (salicylate d'hydroxyéthyle/acétate de dexaméthasone/salicylamide), associations fixes topiques

Avis défavorable au remboursement en raison d'un intérêt clinique insuffisant

L'essentiel

- ▶ CORTISAL crème, DEXTRARINE PHENYLBUTAZONE pommade et PERCUTALGINE gel, spray et solution pour application cutanée sont indiqués (selon leurs AMM) dans le traitement local d'appoint des tendinites et des entorses bénignes.
- ▶ PERCUTALGINE spray est également indiquée dans les arthroses des petites articulations.
- ▶ La pertinence de l'association de plusieurs principes actifs dans ces spécialités n'est pas démontrée. Il n'y a pas d'étude comparant ces associations fixes topiques à un AINS non pyrazolé topique seul.
- ▶ Il existe des alternatives thérapeutiques, notamment les topiques contenant un seul AINS non pyrazolé.

Stratégie thérapeutique

- En cas de tendinopathie, outre l'éviction et la correction d'éventuels facteurs favorisants, on peut proposer des traitements locaux (AINS plutôt au stade aigu, infiltration de corticoïdes) et/ou systémiques, selon la localisation et la sévérité de la tendinopathie. La chirurgie est indiquée en cas de rupture du tendon d'Achille, rotulien ou de l'épaule.
- En cas d'arthroses des petites articulations, les AINS topiques peuvent être utilisés en première ou seconde intention lors des poussées douloureuses éventuelles. La pertinence clinique de l'association des trois principes actifs de PERCUTALGINE spray n'a pas été démontrée dans cette indication.
- **Place de ces spécialités dans la stratégie thérapeutique**
 - Compte tenu des effets indésirables liés à la phénylbutazone et de l'absence de donnée clinique apportant la preuve d'un bénéfice clinique, il n'y a pas de place pour DEXTRARINE PHENYLBUTAZONE pommade dans la stratégie thérapeutique des tendinites.
 - En l'absence de données apportant la preuve d'un bénéfice clinique, la place de CORTISAL crème et de PERCUTALGINE (gel, spray, solution) n'est établie dans la stratégie thérapeutique d'aucune de leurs indications.

Données cliniques

- Aucune donnée ne permet d'apprécier le bénéfice clinique de ces associations fixes en rhumatologie et en traumatologie bénigne.

Intérêt des médicaments

- Le service médical rendu* par ces spécialités est, au regard de celui d'autres thérapies disponibles, insuffisant pour justifier qu'ils soient pris en charge par la solidarité nationale.
- Avis défavorable au maintien du remboursement en ville et de la prise en charge à l'hôpital.

* Le service médical rendu par un médicament (SMR) correspond à son intérêt en fonction notamment de ses performances cliniques et de la gravité de la maladie traitée. La Commission de la transparence de la HAS évalue le SMR, qui peut être important, modéré, faible, ou insuffisant pour que le médicament soit pris en charge par la solidarité nationale.



Ce document a été élaboré sur la base de l'avis de la Commission de la transparence du 27 avril 2011 (CT-8350, 8573, 8642), disponible sur www.has-sante.fr